

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: MANZANO

Morro de Liebre

Tamaño: De medio a grande.

Forma: Tronco-cónica, voluminosa hacia su base, suavemente acostillada. Contorno regular en su mayoría.

Cavidad del pedúnculo: Medianamente amplia o estrecha, de profundidad media o marcada. Bordes levemente irregulares y ondulados. Chapa ruginosa en el fondo o levemente iniciada. **Pedúnculo:** Medianamente largo, fino a grueso; a veces ensanchado en su extremo. Algunas veces aparece, en el lateral de la cavidad, una pequeña giba.

Cavidad del ojo: Amplia y poco profunda o bastante profunda. Bordes ondulados marcando cinco protuberancias y en algunos hasta siete. **Ojo:** Cerrado o entreabierto, encontrándose entre varios alguno abierto, tamaño medio. Sépalos grandes, carnosos en la base, de puntas largas y vueltas, color verdoso y tomentoso.

Piel: Fuerte, grasa o sólo levemente untuosa, frotada suavemente abrillanta sin llegar a un acharolado vistoso. **Color:** Amarillo o verdoso. Chapa de tono rosado mas o menos vivo en zona de insolación. Punteado abundante, blanco y verdoso, aisladamente se encuentra también alguno ruginoso.

Tubo del cáliz: Ancho, triangular o alargado, rara vez lo presenta estrecho. Estambres insertados por la mitad. Pistilo fuerte.

Corazón: Bulbiforme, casi siempre centrado. Eje abierto. Celdas semi-lunares o bien anchas y marcadamente redondeadas, puntiagudas en su inserción.

Semillas: Alargadas.

Carne: Color blanco. Jugosa y levemente aromática.

Maduración: Invierno

